

وزن خشک خود را بدانید

وزن خشک ایده آل شما بدون هیچگونه آب اضافه در بدن است که معمولاً بعد از دیالیز باید به آن بررسید. وزن خشک وزنی است که شما با آن احساس خوبی دارید و هیچ یک از علایم افزایش مایعات بدن مانند افزایش فشار خون، تنگی نفس،ورم دست و پا و صورت، احساس سنجیش در قفسه سینه،برجسته شدن ورید گردنی و علایم از دست دادن بیش از حد آب بدن مانند کاهش فشارخون،گرفتگی عضلات،ضعف شدید راندارید. توجه کنید که وزن خشک قابل تغییر میباشد و ممکن است با چاق و لاغر شدن شما افزایش یا کاهش باید.

میزان مصرف مایعات

صبح ساعتی مشخصی (۸ یا ۹ صبح) که ادرار کردید آن را دور بربزید، سپس در طی ۲۴ ساعت یعنی تا فردا صبح همان ساعت هر چه ادرار کردید را جمع کنید. مجموع حجم آن ها، حجم روزانه ادرار شما می باشد. این مقدار به علاوه ۴۰۰ تا ۸۰۰ سی سی ، مقدار مجاز مصرف مایعات روزانه شما می باشد. اگر دفع ادرار ندارید تنها میتوانید ۸۰۰ سی سی مایعات در طول روز مصرف نمایید. هر لیوان حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ سی سی میباشد.

دقت کنید مایعات شامل آب،شیر،آب خوش،چای و آب موجود در میوه ها و سوپ میباشد.

به طور کلی مصرف آشامیدنی باید در حدی باشد که اضافه وزن بین دو جلسه همودیالیز بیش از ۲ کیلوگرم نباشد.

صرف نمک

فرد دیالیزی می باشد مصرف نمک را در روز به کمتر از ۱۰/۵ گرم کاهش دهد. این میزان نمک هم در غذاهای عادی همچون نان و برنج وجود دارد، از این رو نمک را به غذای فرد دیالیزی اضافه نکنید. از روی برچسب مواد غذایی به میزان سدیم دقت شود و در صورتی که مقدار سدیم آن زیاد است مصرف نشود.

صرف میوه جات

میوه های حاوی پتاسیم موز، خرما، انجیر، زرد آلو، آلو، کیوی، طالبی، پرتقال، گریپ فروت، شلیل و گلابی میتوانند پتاسیم فرد دیالیزی را بالا ببرند و او را در معرض عارضه بسیار کشنده ایست قلبی فرار دهند. از این رو سعی شود در مصرف این گونه میوه ها تا حد امکان پرهیز گردد.

میوه های مناسب برای بیماران دیالیزی خیار و سیب است.

صرف گوشت

■ یک فرد دیالیزی روزانه به ۱۲ گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن خود نیاز دارد. از این رو اگر فردی ۷۰ کیلوگرم وزن دارد، باید روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم گوشت سفید بدون چربی و استخوان مصرف کند.

توصیه های تغذیه ای برای افراد دیالیزی:

✓ پرهیز از مصرف غذا های حاوی سدیم بالا (چیپس و پفک)، چوب شور، بادام شور، بادام زمینی، انواع تخمه ها، زیتون پرورده، خیار شور، کلم شور، ترشی هارب ها، سوسیس و کالباس، کنسرو گوشت، برگرهای سایر فراورده های گوشتی و ما های های دودی، تن ماهی، انواع پنیر ها، غذا های شور و کنسروی و فرایند شده، ترد کننده گوشت ها، سس سویا، سس، خردل، ادویه های مرکب کاری، چاشنی مخصوص سالاد.

✓ محدودیت در مصرف سبزی های غنی از سدیم (اسفناج، کرفس، هویج، کنگر، کلم شلغم، ریواس و چغندر) و غذاهایی که منشاء حیوانی دارند مثل انواع گوشتها، شیر پنیر و تخم مرغ.

✓ سبب زمینی (مگر آنکه پوست گرفته شده و ۸ ساعت در آب خیسانده شود)،



دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

بیمارستان مهر شهرستان تکاب

رژیم غذایی در
بیماران دیالیزی

تایید شده توسط سرپرست علمی بخش

آدرس: بلوار چملی - جنب پمپ بنزین موسوی -
بیمارستان مهر



Email: tekab_amozesh.umsu.ac.ir
واحد آموزش سلامت

در صورت داشتن مشکل لطفاً با تلفن
۱۲۶۰۸۸۵۴۵۵ و داخلی ۱۴۰۳ سوپر وایز
آموزش سلامت تماس بگیرید

بازنگری بهار ۱۴۰۳

✓ مصرف کمتر شیر و ماست (کل روز بیشتر از نصف لیوان نباید مصرف شود)

✓ مصرف کمتر پنیر (بیش از ۳۰ گرم معادل یک قوطی کبریت نباید مصرف شود.)

✓ مصرف انواع گوشت، حبوبات و دانه های روغنی باید کمتر باشد.

✓ مصرف کمتر نوشیدنیهای دارای مقدار متوجه پتاسیم و فسفر (قهوة، چای، آبمیوه های تجاری)

✓ احتیاط در مصرف ویتامین های محلول در چربی

✓ استفاده از مصرف نان کم نمک و سبوسدار

✓ مصرف پنیر کاملاً نمک گرفته

✓ مصرف فیبر غذایی مانند میوه، سبزی، غلات

✓ مصرف آنتی اکسیدان ها مانند ویتامین ث-آ-ای

✓ مصرف ویتامین ب۶ و فولات

✓ مصرف عسل، مربات شاسته گندم، آب نبات، شربت و زله برای افزایش میزان انرژی توصیه می شود.

✓ ویتامین آنتی اکسیدان ها ویتامین ث و ویتامین آو ویتامین ای و بتاکاروتون

✓ مصرف ویتامین های محلول در آب بویژه ب ۶

✓ مصرف نشاسته گندم، آب نبات، و عسل، مربات شاسته یخی، زله و شربت برای افزایش میزان انرژی دریافتی،

✓ مصرف روزانه ۳ واحد میوه و ۳ واحد سبزی

منبع: اصول مراقبت های ویژه در آی سی یو و سی سی یو و دیالیز، تالیف حسین شیرازی - ملاحظت نیک روان مفرد