

فیستول

یکی از قدم های مهم قبل از شروع فرایند دیالیز آماده سازی رگ میباشد. فیستول در واقع اتصال سیاهرگ به سرخرگ بیمار در مج دست یا آرنج میباشد. اینکار طی عمل جراحی انجام و طی ۳-۴ هفته زمان لازم است تارگ آماده شود.

مراقبت از فیستول:

بعد از عمل جراحی، محل فیستول را تمیز نگه دارید و در صورت لزوم با محلول اکسیژنه یا بتادین شستشو و پانسمان کنید.

پس از ایجاد فیستول، ورزشهای دست برای مثال باز و بسته کردن مشت دست و فشردن مکرر یک تکه خمیر را به طور مرتب انجام دهید تا وریدهای اطراف فیستول هرچه زودتر گشاد و برای دیالیز قابل استفاده شود.

بخیه ها ۱۵ روز بعد کشیده می شود

• ممکن است پس از عمل، دست دچار تورم شود که معمولاً با انجام حرکات ورزشی و قرار دادن دست در سطحی بالاتر از سطح بدن تورم کاهش می یابد.

• در صورت بروز درد، تورم ، قرمزی ، گرمی یا ترشح چرکی در فیستول با تورم ساعد و بازوی راست فیستول دار به پزشک معالج خود مراجعه کنید.

• از آویزان کردن کیف سنگین بر روی شانه و برداشتن اجسام سنگین (حداکثر ۲ کیلوگرم) اجتناب شود.

• فیستول ۴ تا ۶ هفته بعد از ایجاد، آماده استفاده می باشد.

• با لمس یک فیستول فعال، لرزشی در زیر دست خود احساس می کنید، در صورت این لرزش سریعاً به جراح مربوطه مراجعه کنید.

• باید از فشار بر روی فیستول و ناحیه بالاتر از آن بپرهیزید.

• از پوشیدن لباس هایی با آستین تنگ که بر روی فیستول فشار می آورند بپرهیزید

• گرفتن فشار خون ، تزریق وریدی و خونریزی از دست فیستول دار ممنوع است

• گاه فیستول دچار آنوریسم می شود؛ یعنی در یک ناحیه به شدت برجسته و پرخون می گردد،

• دقیت کنید آنوریسم چون جدار نازکی دارد در خطر پارگی و خونریزی است، آن را به جراح مربوطه نشان دهید به خصوص اگر پوست روی آن نازک شده باشد.



دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

بیمارستان مهر شهرستان تکاب

مراقبت از فیستول

دربیماران دیالیزی

تاییدشده توسط سرپرست علمی بخش

آدرس: بلوار چملی - جنب پمپ بنزین موسوی -
بیمارستان مهر



Email: tekab_amozesh.umsu.ac.ir
 واحد آموزش سلامت

در صورت داشتن مشکل لطفاً با تلفن
۱۲۶ و داخلی ۴۵۵۲۸۸۱۶ سوپر واپر
آموزش سلامت تماس بگیرید

بازنگری بهار ۱۴۰۳

- استفاده از آب سرد و آب گرم برای کارکرد بهتر فیستول توصیه می شود.



منبع: اصول مراقبت های ویژه در آی سی یو وسی سی یو و
دیالیز، تالیف حسین شیرازی - ملاحت نیک روان مفرد

مراجعه شود تا از کم آبی بدن و احتمال از کار
افتادگی فیستول جلوگیری شود.

- بعد از اتمام دیالیز و پس از خروج سوزن ها، روی محل را با دست به مدت ۲۰ دقیقه فشار دهید.

تا چند ساعت بعد از دیالیز برای پرهیز از ایجاد عفونت حمام نکنید.

از دراز کشیدن، چرخیدن روی اندام فیستول دار، بستن دستبند و ساعت در دست فیستول دار پرهیز کنید.

برای نرم شدن پوست ناحیه سوزنی از پماد آد استفاده کنید.